

Hoja informativa para detectar piojos

Estimados padres

En la clase/en el jardín infantil de su hijo se han encontrado liendres (huevos de piojos) o piojos en un niño.

¡No se asuste! Liendres o piojos no se debe asociar a malos hábitos higiénicos. Los piojos también pueden colonizar la cabeza cuidada. Por lo tanto: cacemos los piojos en lugar de buscar culpables.

Nuestra colaboradora de intervención en caso de infestación de piojos, ha examinado hoy brevemente los cabellos de toda la clase y ha encontrado lo siguiente:

- ☐ Ni piojos, ni liendres → no es necesario tomar medidas
- ☐ Liendres, pero no piojos → buscar los piojos, véase abajo
- ☐ Piojos vivos → necesita terapia (vea la segunda página) y deslindrar el cabello repetidamente, vea búsqueda de piojos

Búsqueda de piojos:

El deslindrar el cabello / la búsqueda de piojos necesita tiempo (30-60 minutos), buena luz e idealmente una ocupación / distracción para el niño, para que se quede tranquilo.

Deslindrar el cabello mojado: Este método de tratamiento se realiza dos veces por semana y una vez por semana para la profilaxis de la manera siguiente:

- Mojar el cabello
- Untar el acondicionador (Conditioner) en todo el cabello. Este paraliza los piojos por un cierto tiempo y facilita el peinado del cabello. Desenredar el cabello con un peine regular, después pasar a la lendrera.
- Peine con la lendrera el cabello, mechón por mechón desde el cuero cabelludo (ahí se encuentra la mayoría de los piojos/liendres) hasta las puntas del cabello y extienda la espuma en un papel de cocina blanco. De esta manera se puede reconocer fácilmente los piojos y larvas (ninfas). Además, pueda ser que así se elimine también los huevos/las liendres. Los huevos se pueden ver como puntos oscuros en el papel de cocina blanco. Las liendres blancas apenas se pueden detectar.

Si solo se encuentra liendres, entonces debería realizar la búsqueda de piojos dos veces más en un intervalo de 3 días. ¡En caso de que no se encuentren piojos, puede usted cerrar el tema! Además, no son necesarias medidas especiales.

El test es positivo (es decir, hay una infestación de piojos), si se ha encontrado un piojo o una larva. La detección de huevos/liendres no cuenta como infestación de piojos, puesto que las liendres son inofensivas, pueden provenir de una infestación anterior de piojos, apenas se puede distinguir a los huevos, si están muertos o vivos.

El Médico Escolar

GemeinschaftsPRAXIS
Dr. Kamelija Gropp
Dr. Thomas Gropp
Oberer Garten 1, 8598 Bottighofen
071 688 44 75

La encargada de intervención en caso infestaciones de piojos

Helga Keller
helga.keller@gmx.ch

Stellvertretung:
Frau Schläfli 079 302 71 59 / 071 672 43 41

Hoja informativa para el tratamiento de piojos

En caso de infestación de piojos se recomienda los siguientes pediculicidas:

Prioderm	de prestación obligatoria
Loxazol	muchas caja de enfermedad lo reembolsan
Laus-Stopp von Rausch	con sustancias activas naturales

Se pueden obtener en una farmacia o en el médico de cabecera / pediatra. Por favor siga las instrucciones de uso. Además, hasta finalizar la terapia, debería realizar dos veces por semana la búsqueda adecuada de piojos.

Medidas necesarias complementarias:

- Al quitar la bisutería del cabello pueden ser llevados y transmitidos por descuido piojos. Por eso los peines, cepillos, pasadores del pelo, coleteros etc. deben colocarse en una solución de jabón (60°C) durante 10 minutos.
- El cabello largo atarlo durante el día, para que no pueda rozarse y los piojos no puedan pasar de una cabeza a otra.
- Una vez a la semana un control de todos los miembros de la familia, deslindrando el cabello mojado (véase arriba) hasta 2 semanas después de la última detección de larvas o piojos.

Medidas redundantes, innecesarias

- Lavar ropa de cama, pijamas, ropa, toallas de baño
- Limpiar el suelo, sofá y cama con la aspiradora
- Los piojos no se pueden transmitir a través del sombrero. Los gorros, cascos no tienen que ser tratados.
- Los animales de trapo no tienen que ser aislados de los niños, lavados o puestos en el congelador.
- Los cabellos no tienen que cortarse puesto que cinco milímetros de cabello largo es suficiente para servir de apoyo a los huevos/liendres.
- Esta hoja informativa de la escuela y una lendrera se le entregará a su hijo. Para tratamientos adicionales ustedes como padres son los responsables.

Informaciones adicionales: www.lausinfo.ch

El Médico Escolar

GemeinschaftsPRAXIS
Dr. Kamelija Gropp
Dr. Thomas Gropp
Oberer Garten 1, 8598 Bottighofen
071 688 44 75

La encargada de intervención en caso infestaciones de piojos

Helga Keller
helga.keller@gmx.ch

Stellvertretung:
Frau Schläfli 079 302 71 59 / 071 672 43 41